



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

C.F./P. IVA 001151150867

Prot. n. 90785

ENNA

**Servizio Farmaceutico Territoriale**

**Distretto Enna**

**Ai Direttori di Distretto**

**Al Direttore UOC Assistenza Sanitaria di Base**

**Al Direttore UOC Assistenza Specialistica**

**Al Direttore Sanitario P.O. Umberto I Enna**

**Al Segretario della FIMMG**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Fluorochinoloni – Nota informativa importante

Con la presente si trasmette la nota prot. n. 46004 del 30/10/2020 dell'Assessorato della Salute avente come oggetto "Nota informativa importante inerente su Fluorochinoloni ad uso sistemico ed inalatorio" in seguito pubblicazione di una nota avente pari oggetto sul sito dell'AIFA.

I titolari di Autorizzazione all'Immissione in Commercio di antibiotici fluorochinoloni (ciprofloxacina, delafloxacina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina) in accordo con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l'Agenzia Italia del Farmaco (AIFA) hanno comunicato che i **fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio possono aumentare il rischio di rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache.**

Le condizioni che predispongono a tale rischio sono le seguenti:

- patologie congenite o preesistenti delle valvole cardiache
- malattie del tessuto connettivo (es. sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos)
- sindrome di Turner
- malattia di Behcet's
- ipertensione
- artrite reumatoide
- endocardite infettiva

pertanto in questi pazienti i fluorochinoloni devono essere utilizzati solo dopo attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio e dopo aver preso in considerazione altre opzioni terapeutiche. I pazienti devono rivolgersi immediatamente al medico in caso di dispnea acuta, insorgenza *de novo* di palpitazioni o comparsa di edema addominale o degli arti inferiori.


Si ricorda, inoltre, che con nota prot. n. 29028 del 26/06/2020 l'Assessorato della Salute aveva reso note le decisioni assunte a livello europeo circa le restrizioni d'uso di questa classe di farmaci.

Sono state segnalate, infatti, con gli antibiotici chinolonici e fluochinolonici reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti a carico del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso. Di conseguenza, da una valutazione del rapporto rischio/beneficio si limita l'utilizzo di questi farmaci alle infezioni gravi che non si risolvono facendo ricorso ad antibiotici di altre classi, mentre i medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico sono stati ritirati dal commercio.

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di voler dare la massima diffusione della presente a tutti gli operatori sanitari, con particolare riferimento alle figure specialistiche interessate.

Il Farmacista Dirigente

Dr.ssa Paola Greca



Il Direttore

U.O.C. Farmacia Territoriale

Dr. Calogero Russo

